

betteryouknow.org/es

Remítase a los recursos de la NBDF a continuación para obtener más información.

Referencias

HANDI, Centro de Recursos Informativos de la NBDF
bleeding.org/handi

Capacitación de la NBDF para proveedores de atención médica Mujeres con trastornos hemorrágicos
bleeding.org/hcp-resources

Otros Recursos

Información sobre los trastornos hemorrágicos en las mujeres, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
cdc.gov/female-blood-disorders/



Directorio de centros de tratamiento de la hemofilia, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
dbdgateway.cdc.gov/HTCDirSearch.aspx



betteryouknow.org/es



bleeding.org



La marca "CDC" es propiedad del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE.UU. y se usa con permiso. El uso de este logotipo no es un aval por parte del HHS o los CDC de ningún producto, servicio o empresa en particular.

La Fundación Nacional de Trastornos Hemorrágicos (NBDF) desea expresar su agradecimiento a todo el equipo de trabajo de Better You Know por sus conocimientos y revisión, particularmente a Robert F. Sidonio, Jr, MD, MSc. y a Chris Guelcher, RN-BC en hemostasis, MS, PPCNP-BC, así como a Charletta A. Ayers, MD, MPH, y a Gloria A. Bachmann, MD, MMS. La información contenida en esta publicación es solo información general. La NBDF no proporciona asesoramiento médico ni ejerce la práctica de la medicina. La NBDF no hace, bajo ninguna circunstancia, recomendaciones de tratamientos en particular a personas específicas y recomienda que, en todos los casos, se consulte al médico o centro de tratamiento local antes de iniciar cualquier curso de tratamiento.

© 2024 Fundación Nacional de Trastornos Hemorrágicos.

Para ginecólogos obstetras


NO DEJE PASAR LOS SIGNOS.

Los trastornos hemorrágicos en las mujeres y las niñas: detección, pruebas y coordinación de la atención médica



betteryouknow.org/es

LOS TRASTORNOS HEMORRÁGICOS EN LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

 **Hasta un 1 %** de las mujeres tienen un trastorno hemorrágico y muchas no lo saben.

 **La enfermedad de Von Willebrand (VWD) es el trastorno hemorrágico más común en las mujeres.**

- Su prevalencia general entre hombres y mujeres es de 0.6 a 1.3 %.
- Se diagnostica en entre el 5 y el 24 % de las mujeres con sangrado menstrual abundante.
- A pesar de que se tengan antecedentes positivos de sangrado excesivo, es frecuente que no se diagnostique debido al amplio rango de intensidad del trastorno.

 **Deficiencias del factor**

- Las mujeres pueden tener deficiencias del factor VIII (hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B)
- Otras deficiencias raras de los factores (II, V, VII, X, XI, XIII)

 **Trastornos plaquetarios cualitativos**

- Deficiencias de almacenamiento alfa y delta

 **Otros trastornos hemorrágicos raros**

- Trombastenia de Glanzmann
- Síndrome de Bernard-Soulier



Es mejor que sepa: Pasos para la detección, las pruebas y la coordinación de la atención médica

Paso 1. Analizar los síntomas

Examine si su paciente presenta **ALGUNO** de los siguientes síntomas:

Sangrado menstrual abundante:

- Tener sangrado menstrual que dura más de 7 días.
- Cambiarse de toalla sanitaria o tampón cada hora o más frecuentemente los días de mayor flujo.
- Usar más de una toalla sanitaria o tampón, o los dos, a la vez o cambiárselos durante la noche.
- Tener deficiencia de hierro.
- Tener coágulos menstruales más grandes que el tamaño de una uva.

Sangrado uterino anormal

- Sangrado abundante con aborto espontáneo.

Otros síntomas

- Sangrados nasales que suceden sin causa aparente y que duran más de 10 minutos o que requieren atención médica.
- Propensión a los moretones con poco o nada de traumatismo físico aparente.
- Sangrado excesivo después de un procedimiento médico o una extracción dental.
- Antecedentes de sangrado muscular o articular sin traumatismo físico.
- Antecedentes familiares de hemorragia.

Cualquiera de estos síntomas podría ser signo de trastorno hemorrágico.

Paso 2. Determinar el riesgo

Determine el nivel de riesgo de que su paciente tenga un trastorno

Remita a la paciente a www.betteryouknow.org/es/i-want-to-know-for-women para que responda las preguntas de la Herramienta de Tamizaje Phillip durante la cita médica. Si el resultado indica que está "en situación de riesgo", se necesitarán pruebas de laboratorio para determinar si tiene un trastorno hemorrágico.



Paso 3. Coordinar la atención médica para las pruebas de diagnóstico

La coordinación de la atención médica entre los proveedores médicos de la paciente y el hematólogo es esencial para el diagnóstico preciso. Para buscar un hematólogo en un centro de tratamiento de la hemofilia cercano, vaya a www.hemophilia.org.

Coordine la atención médica

Trabaje con un hematólogo para encontrar un laboratorio especializado en su región y ordene pruebas de laboratorio para su paciente.

Debido a la compleja naturaleza del diagnóstico, lo habitual es hacer pruebas de detección más de una vez. Tenga en cuenta que los resultados pueden variar con base en distintos factores, como el estado de salud actual de la paciente, sus niveles hormonales, el uso de otros medicamentos y cómo se manipula la muestra de sangre. Además, las siguientes circunstancias pueden afectar los niveles del factor de la coagulación: estrés, ejercicio reciente, embarazo, operación reciente, tipo sanguíneo, ciclo menstrual y edad.

Las pruebas de diagnóstico comunes incluyen:

- Hemograma completo (CBC)
- Tiempo de tromboplastina parcial activado (aPTT)
- Tiempo de protrombina (PT)
- Actividad de fibrinógeno
- Tirotropina (TSH) • Tiroxina (T4)
- Tiempo de trombina
- Perfil de enfermedad de Von Willebrand (VWD)
 - Prueba de antígenos del factor Von Willebrand (VWF; VWF:ag)
 - Prueba de cofactor ristocetina (VWF:Rco) también conocida como de actividad de VWF
 - Actividad del factor VIII
- Pruebas de la función plaquetaria: Tiempo de cierre PFA-100

Pasos siguientes

Si las pruebas indican que hay un trastorno hemorrágico:

Coordine la atención médica con un hematólogo, para el manejo de los síntomas del trastorno hemorrágico. Si desea obtener más información sobre el diagnóstico y el tratamiento, remítase a la serie gratuita de seminarios web para proveedores sobre las mujeres con trastornos hemorrágicos, de la Fundación Nacional de Hemofilia (NBDH), que cuenta con acreditación como proveedor: www.hemophilia.org/Researchers-Healthcare-Providers/Health-Care-Provider-Education

Si las pruebas indican que los síntomas no se deben a un trastorno hemorrágico:

Recuerde, el diagnóstico de estos trastornos es complejo. Considere repetir las pruebas de laboratorio si sigue teniendo la fuerte sospecha de que la paciente tiene un trastorno hemorrágico. Si tiene preguntas adicionales, consulte a un hematólogo en el centro de tratamiento de la hemofilia más cercano.